

INICIAÇÃO A DOCÊNCIA NA DISCIPLINA DE MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO POR MEIO DO RELATO DE FRENECTOMIA LINGUAL EM ADULTOS PELA

TECNICA CONVENCIONAL

VIII Seminário Institucional de Iniciação à Docência

Karen Ananda Souza da Silva, Marcelo Bonifácio da Silva Sampieri, Denise Hélen Imaculada Pereira de Oliveira, Rayssa de Fatima Lopes Arruda Carneiro, Luzia Mesquita Bastos, Filipe Nobre Chaves

O Programa de Iniciação a Docência no ambiente da disciplina de Métodos de Diagnóstico do curso de Odontologia da UFC Sobral proporciona ao acadêmico de odontologia uma maior aproximação com a realidade da profissão bem como permite ampliar os espaços de ensino-aprendizagem e estimular o interesse pela carreira docente. Nesse contexto, a orientação exercida pelo monitor na prática clínica odontológica torna-se um momento muito rico e produtivo. Assim, o presente trabalho tem como objetivo relatar 2 casos de frenectomia lingual em pacientes adultos na qual foi submetido ao diagnóstico e tratamento na disciplina de Métodos de Diagnóstico sob a visão da iniciação a docência, incluindo uma revisão de literatura sobre o assunto. A anquiloglossia é uma anomalia oral congênita que pode ser assintomática ou pode dificultar os movimentos da língua, causar dificuldades para o paciente na pronúncia de alguns fonemas, dor e desconforto na deglutição, problemas periodontais e dificuldades para os bebês na amamentação, uma vez que a sucção esta associada à adequada mobilidade da língua. O tratamento dessa condição pode ser cirúrgico, quando se realiza a frenectomia, ou conservador, quando se faz tratamento com fonoaudiólogo. A busca de dados bibliográficos foi realizada no banco de dados PubMed, com os descritores: "Lingual Frenum", "Ankyloglossia" e "Surgery", com uma limitação temporal de 10 anos, resultando em 111 artigos. Após exclusão de relatos de caso, meta-análise e estudos que não atendessem aos objetivos do trabalho, 4 artigos foram selecionados. As

As técnicas cirúrgicas removidas para o do freio lingual podem ser classificadas em s procedimentos: frenotomia, frenectomia, e a frenuloplastia, podendo ser realizadas com o uso do bisturi ou uso do laser. Dentre as indicac