

# ATRASOS OBSTÉTRICOS EM UMA MATERNIDADE DE REFERÊNCIA E SUA RELAÇÃO COM O PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

XXXVII Encontro de Iniciação Científica

Adriana Moreno de Lima, SÂMUA KELLEN MENDES DE LIMA, MYLENA OLIVEIRA PITITINGA LIMA, MARCELLA ROCHA TAVARES SOUZA, Ana Kelve de Castro Damasceno

A investigação da morte materna tem sido complementada com estudos sobre Morbidade Materna Grave (MMG) e Near Miss Materno (NMM), pois estima-se que ocorram até 20 casos de MMG/NMM para cada óbito materno, sendo que grande parte desses casos podem ser evitados caso a mulher receba uma assistência de qualidade e em tempo oportuno. Assim, os atrasos envolvidos no processo podem ocorrer em três fases: demora na busca ao serviço de saúde (demora 1), dificuldade de deslocamento até a unidade (demora 2) ou devido às questões relacionadas ao serviço (demora 3). O presente estudo teve por objetivo categorizar os atrasos mais prevalentes em uma maternidade de referência e relacioná-los com as variáveis sociodemográficas. Trata-se de corte transversal, com análise de dados quantitativa, realizado entre os meses de agosto de 2017 a julho de 2018, em uma maternidade de referência de Fortaleza, utilizando como referencial teórico o Modelo das Três Demoras. A população foi composta por todas as mulheres que foram admitidas na Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC) durante o período do estudo, que estiveram internadas na clínica obstétrica de alto risco ou na UTI, e que apresentaram morbidade materna grave near miss ou não-near miss, segundo os critérios da OMS. Em relação à ocorrência de demoras, houve prevalência da demora fase 1 (63% das mulheres apresentaram pelo menos um critério), seguida pela demora fase 3 (52% das mulheres) e, por fim, a demora fase 2 (45% das mulheres). Os cruzamentos das Demoras Obstétricas com as variáveis socioeconômicas não evidenciaram associação estatística. Dessa forma, conclui-se que é expressivo o número de demoras obstétricas principalmente do tipo 1, sendo imprescindível o estudo desses fatores associados ao near miss materno para que sejam tomadas medidas a fim de se minimizarem tais circunstâncias, com ênfase nos cuidados obstétricos apropriados. Agradecimento ao órgão financiador CNPq.

Palavras-chave: Saúde Materna. Enfermagem. Near Miss. Saúde da Mulher.