

AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA E DOS FATORES DE RISCO DA NÁUSEA E VÔMITO PÓS-OPERATÓRIA EM CIRURGIAS BUCO-MAXILO-FACIAIS SOB ANESTESIA GERAL

XXXVII Encontro de Iniciação Científica

Mariana Gomes Coutinho, SORAIA RODRIGUES DE GOES, JOSÉ RÔMULO DE MEDEIROS, MAYKEL SULIVAN MARINHO, Eduardo Costa Studart Soares

O presente trabalho objetiva avaliar a incidência de náuseas e vômitos pós operatórios (NVPO) em pacientes submetidos a cirurgia buco-maxilo-facial sob anestesia geral, bem como identificar os principais fatores de risco associados a esses episódios. A amostra será composta por 400 pacientes atendidos no serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial no período entre setembro de 2012 a setembro de 2017. Após a aprovação do projeto no Comitê de Ética em Pesquisa, em uma ficha clínica previamente elaborada, serão coletados os seguintes dados dos prontuários: dados biométricos; hábitos nocivos (como tabagismo e uso de álcool), histórico médico (cirurgias prévias, doença sistêmica prévia, episódio prévio de náusea e vômito pregresso), prescrição pré-operatória, avaliação anestésica (drogas utilizadas na anestesia, tempo de anestesia), bem como dados da realização do procedimento cirúrgico e relativos ao pós operatório imediato dos pacientes da amostra. Os dados serão analisados através do programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 17.0 para Windows®. As variáveis serão então cruzadas e os resultados obtidos serão expostos em gráficos e tabelas. Esperamos que a presente pesquisa além de auxiliar na identificação dos principais fatores de risco da NVPO, abra caminho, em trabalhos futuros, para o desenvolvimento de um protocolo medicamentoso, de baixo custo, que ajude na redução desta complicação.

Palavras-chave: surgery. benzodiazepines. symptoms. bucomaxillofacial.