

INFLUÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO E DAS INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS NA ADESÃO AO TRATAMENTO DE PACIENTES CHAGÁSICOS COM BENZNIDAZOL

XXXVII Encontro de Iniciação Científica

Julieth Mesquita Lacerda, ALANNA CARLA DA COSTA, MARIA JULIA VIDAL ARRUDA, GABRIEL THÉ ARAÚJO GÓMES, Maria de Fatima Oliveira

A doença de Chagas (DC), causada pelo protozoário hemoflagelado *Trypanosoma cruzi*, ainda é um problema de saúde pública grave na América Latina. O Benznidazol (Bz), único fármaco disponível para tratar DC no Brasil, apresenta grande toxicidade, levando a diversas reações indesejáveis. O objetivo do estudo foi avaliar a influência do acompanhamento farmacoterapêutico na adesão ao tratamento de pacientes chagásicos com Bz. Tratou-se de um estudo descritivo observacional de seguimento que avaliou o perfil farmacoterapêutico dos pacientes acompanhados pelo Laboratório de Pesquisa em Doença de Chagas (LPDC) - UFC, no período de Junho de 2017 a Junho de 2018. Foram incluídos 24 pacientes do LPDC, com idade média de 53 anos, maioria procedente do interior do estado do Ceará (79,17%), com baixa escolaridade (30% fundamental incompleto) e renda familiar de um salário mínimo (41,67%). Com relação às comorbidades que acometiam os pacientes, o principal sistema afetado foi o cardiovascular (55,00%), onde os fármacos mais utilizados foram Anlodipino, Losartana, Carvedilol e Ácido Acetilsalicílico. Do total de pacientes tratados (24), a adesão completa ao tratamento foi observada em 41,7% (10) dos indivíduos. Os Problemas Relacionados a Medicamentos (PRMs) foram observados em 21 pacientes, com um total de 41 PRMs, sendo os mais frequentes insegurança não quantitativa (PRM 5) e de necessidade (PRM 1). Foram realizadas 52 intervenções farmacêuticas, em que 76,92% ocorreram na educação dos pacientes, 17,30% na estratégia farmacológica e 5,78% sobre a quantidade do fármaco prescrito. Os resultados demonstram que a atuação do Farmacêutico Clínico na equipe multidisciplinar em saúde contribui para a melhoria da assistência do portador de DC. O acompanhamento farmacoterapêutico se mostrou fundamental para adesão dos pacientes ao tratamento com Bz, o que conduz a uma maior eficácia na obtenção dos resultados terapêuticos.

Palavras-chave: Doença de Chagas. Benznidazol. Intervenções Farmacêuticas. Farmácia Clínica.