

EFEITOS ADVERSOS RELACIONADOS À TERAPIA ANTIRRETROVIRAL EM PESSOAS VIVENDO COM HIV

XXXVIII Encontro de Iniciação Científica

Debora Clemente Paes, Nycolle Almeida Leite, Odaléia de Oliveira Farias, Marli Teresinha Gimeniz Galvao

Introdução: A terapia antirretroviral (TARV) é a principal forma de tratamento para Pessoas Vivendo com HIV (PVHIV), uma vez que leva a melhora do sistema imunológico e da qualidade de vida. No entanto, o uso da TARV pode causar efeitos adversos, os quais podem afetar diretamente na adesão ao tratamento. **Objetivo:** Descrever os principais efeitos adversos relacionados à terapia antirretroviral em pessoas vivendo com HIV. **Metodologia:** Estudo transversal, realizado entre segundo semestre 2016 e o primeiro semestre 2017, em um serviço de assistência especializada, de Fortaleza - Ceará. Foram incluídas pessoas vivendo com HIV, maiores de 18 anos, em uso de Terapia antirretroviral, que apresentassem efeitos adversos. **Resultados:** A amostra foi composta de 73 pessoas, sendo a maioria do sexo masculino (89,0%), na faixa etária de 18 a 29 anos (46,6%), escolaridade de 10 a 12 anos de estudo (43,8%), com quatro anos ou mais de diagnóstico de HIV (60,3%) e quatro anos ou mais de tempo de tratamento (56,2%). Os efeitos adversos mais prevalentemente citados foram: tontura (50,7%), distúrbios gastrointestinais (31,5%), distúrbios do sono (30,1%), e distúrbios cognitivos (15,1%), respectivamente. **Conclusão:** Diferentes efeitos adversos foram relatados pelos indivíduos do estudo, com destaque para a tontura. Desse, modo recomenda-se a realização de intervenções de saúde com foco nas principais queixas relatadas pelos pacientes.

Palavras-chave: HIV. TERAPIA ANTIRRETROVIRAL. EFEITOS ADVERSOS. TONTURA.