

PERFIL DO CONHECIMENTO DE CUIDADORES DE CRIANÇAS INSTITUCIONALIZADAS SOBRE SAÚDE BUCAL

XXXVIII Encontro de Iniciação Científica

Ana Carolina da Silva Saraiva, Francisco Samuel Aurélio Bezerra, Marianna Landim Barboza, Patrícia Silveira Damasceno, Regina Gláucia Lucena Aguiar Ferreira

A cárie dentária constitui um dos principais problemas de saúde bucal no Brasil. Essa lesão pode influenciar o desenvolvimento da criança e sua participação em atividades importantes. Em instituições de acolhimento, os cuidadores são os principais responsáveis pela saúde oral das crianças. Devido à literatura acerca do tema ser reduzida e sabendo da alta prevalência da cárie e do seu impacto na saúde pública, tornou-se evidente a relevância deste estudo. O objetivo é descrever o perfil de cuidadores de crianças institucionalizadas em abrigos de Fortaleza (CE) quanto ao conhecimento sobre saúde bucal infantil. Foi realizado um estudo descritivo, transversal, de natureza quantitativa, utilizando um questionário semiestruturado, previamente testado. As informações foram inseridas em um banco de dados do programa Excel® e analisadas estatisticamente no programa software Statistical Package for the Social Sciences® (SPSS) versão 17.0 para Windows®. Os dados foram tabulados e, em sua análise, foram empregados os testes apropriados, com nível de significância de 5% estatística descritiva, podendo ser expressos em forma de média aritmética \pm “desvio padrão” da média. Dentre os entrevistados, a maioria afirmou que os movimentos de escovação devem ser horizontais, verticais e circulares (38,5%) e que o mais importante é colocar creme dental cobrindo todas as cerdas (34,2%) e utilizar a escova na posição correta, com movimentos e quantidade de dentífrico corretos (34,2%). Os participantes afirmaram ser o açúcar (84,2%) o principal causador da cárie e que esta é ocasionada pela má escovação associada ao açúcar em excesso (56,8%). A maioria afirmou que o flúor serve para fortalecer os dentes e combater a cárie (60,5%), que as crianças devem sim utilizar dentífrico fluoretado (78,4%) e o fio dental (34,3%). Constatou-se lacunas de conhecimento entre os cuidadores, remetendo à necessidade de se implementar programas educativos direcionados a esse público.

Palavras-chave: SAÚDE BUCAL. CRIANÇA INSTITUCIONALIZADA. CUIDADORES. CÁRIE.