

FRENOTOMIA LINGUAL REALIZADA EM BEBÊS NO PROJETO DE EXTENSÃO GRUPO DE ESTUDOS EM ODONTOPODIATRIA (GEOP)

Samuel Rocha Franca, Kalina Santos vasconcelos, Josfran da Silva Ferreira Filho, José Luciano Pimenta Couto, Nara Juliana Custódio de Sena, Beatriz Gonçalves Neves

A anquiloglossia é uma condição popularmente conhecida como “língua presa” que apresenta alterações anatomofuncionais do freio lingual. Tais alterações podem causar interferência na alimentação, mastigação e fonação. Esta desordem pode ser observada em bebês recém-nascidos, em que muitas vezes irá interferir na qualidade durante o ato de amamentação, prejudicando uma etapa extremamente importante para a formação do bebê. Quando indicada a realização de tratamento cirúrgico, a frenotomia lingual apresenta-se como um procedimento simples e rápido, que consiste de uma pequena incisão do frênuo lingual. Tendo em vista esse quadro clínico, o presente trabalho tem como objetivo descrever o exame e o protocolo cirúrgico realizado no projeto de extensão Grupo de Estudos em Odontopediatria (GEOP) da UFC-Sobral para avaliação de bebês. O GEOP apresenta como um dos seus objetivos oferecer a realização de tratamento cirúrgico para os bebês que apresentem alteração do freio lingual. O atendimento de crianças de 0 a 3 anos de idade é realizado para aqueles pacientes que comparecerem ao projeto por demanda espontânea ou com uma indicação de outro profissional de saúde. A avaliação do frênuo lingual em recém-nascidos é necessária e deve ser realizada precocemente. Um protocolo clínico baseado no Teste da Linguinha proposto por Martinelli et al. (2012) e prontuário específico foram elaborados para esse tipo de avaliação e posterior acompanhamento após realização do procedimento cirúrgico no projeto GEOP, como uma forma de padronizar e estabelecer um critério para realização das cirurgias de frenotomias. Conclui-se que é de fundamental importância a realização do exame do freio lingual em bebês para que sejam identificadas anormalidades da sua inserção e posterior indicação ao tratamento cirúrgico, promovendo assim uma melhora da qualidade de vida do bebê e, consequentemente, da mãe.

Palavras-chave: anquiloglossia, bebês, aleitamento materno, freio lingual.