

COMPARAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRIAGEM DOS MÉTODOS AUTO RELATADO, POR VIDEOCONFERÊNCIA E PRESENCIAL EM SUJEITOS COM TENDINOPATIA PATELAR

XIII Encontro de Pesquisa e Pós-Graduação

ShalimÁ FigueirÊdo Chaves CoÊlho Ferreira, Pedro Olavo de Paula Lima, Marcio Almeida Bezerra, Rodrigo Ribeiro de Oliveira

INTRODUÇÃO: Durante a pandemia do Novo Coronavírus o COFFITO regulamentou o serviço de teleconsulta. Por ser um método novo de avaliação é necessário compreender sua capacidade de triagem dos pacientes. **OBJETIVOS:** Comparar a capacidade de triagem dos métodos auto relatado, por videoconferência e presencial em sujeitos com tendinopatia patelar (TP). **MÉTODOS:** Foram recrutados nas redes sociais sujeitos com dor no joelho. Foram realizadas três etapas de triagem para verificar a adequação aos critérios de elegibilidade de uma pesquisa em tendinopatia patelar, que era o desfecho principal. A primeira triagem (F1) foi realizada através de formulário on-line, que selecionou quem relatou sentir dor maior que 3 na escala visual analógica (EVA) no TP, que sentia dor no TP ao realizar agachamento unipodal (AU), que nunca fez cirurgia no joelho sintomático e que pontuou mais que 81 no VISA-P. A segunda triagem (F2) foi realizada por videoconferência, que selecionou quem apontou o TP indicando a queixa álgica e, ao realizar AU, teve percepção subjetiva de dor (PSD) maior que 3 na EVA, além de relatar histórico de dor compatível com tendinopatia. A terceira triagem (F3) foi realizada de forma presencial. O avaliador verificou se houve dor ao palpar o TP, se após 10 AU a PSD foi maior que 3 e se pontuação do VISA-P foi maior que 81. Para a descrever os dados foram utilizadas medidas de frequência simples e relativa. **RESULTADO:** Participaram da F1 501 sujeitos. Foram selecionados para a F2 68 indivíduos para a F3, nove sujeitos (13,2% dos selecionados na F1). Foram incluídos na pesquisa seis sujeitos (66,7% dos selecionados na F2). Dos participantes da F2, 8,8% se encaixaram nos critérios de elegibilidade na avaliação presencial. **CONCLUSÃO:** Dos 68 sujeitos que relataram ter os sintomas referentes a TP, apenas 13,2% apresentaram os sintomas durante a videoconferência e 8,8% apresentaram os sintomas em avaliação presencial, sendo assim incluídos na pesquisa de tendinopatia patelar.

Palavras-chave: Tendinopatia. Triagem. Consulta remota. Dor musculoesquelética.