

ANÁLISE DO PERFIL DE PSICOFÁRMACOS UTILIZADOS PARA DESINTOXICAÇÃO POR DROGAS DE ABUSO EM UM HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL

Ana Patrícia Oliveira Moura Lima, Juliana Pereira Queiros, Vitoria de Oliveira Almeida Andrade, Talita Hayata Dantas Rodrigues Alencar Araripe Bezerra, Rafaela Holanda Coelho, Francisca Clea Florenco de Sousa

Objetivo: Analisar o perfil de psicofármacos utilizados para desintoxicação por drogas de abuso em um hospital de saúde mental. **Métodos:** Estudo exploratório, descritivo, retrospectivo e quantitativo, realizado em um hospital de saúde mental de Fortaleza/CE. Os dados (medicamentos, diagnóstico clínico, uso de drogas ilícitas, entre outros) foram coletados dos prontuários do serviço. A análise foi realizada por meio de estatística descritiva (frequências absoluta e relativa, média e desvio padrão). **Resultados:** Foram analisados registros de 90 prontuários de pacientes internados pelo uso de drogas de abuso na unidade de desintoxicação, no período de janeiro a julho de 2021, gênero masculino, faixa etária entre 18 e 59 anos, com média de 38 anos e DP de 10,79 anos. A média de dias de internação foi de 10 dias, com desvio padrão de 4,74. De acordo com o diagnóstico, considerando-se o CID-10, as três principais causas de internação foram, os transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, responsável por 62,96% das internações; os transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de cocaína, com 20,21%; e os transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool, com 16,83%. Em relação aos medicamentos a classe medicamentosa mais prescrita foi a dos Benzodiazepínicos, com 37%, sendo preponderante o uso do princípio ativo Diazepam em 81% dos casos; seguida dos Anticonvulsivantes com 31% das prescrições, com o Topiramato sendo o mais prescrito (71%); os Antipsicóticos foram responsáveis por 18% das prescrições, sendo a Clorpromazina o principal (35%); e os Antidepressivos, em 14% das prescrições, sendo a mais prescrita a Fluoxetina, em 31% dos casos. **Conclusão:** O estudo permitiu verificar a prescrição de medicamentos psicotrópicos, identificando a farmacoterapia utilizada para pacientes em desintoxicação por drogas de abuso, além de traçar o perfil diagnóstico das internações.

Palavras-chave: Psicotrópicos. Transtornos Relacionados ao Us. Dependência Química. Psicofármacos.