

AVALIAÇÃO DOS ESQUEMAS TERAPÊUTICOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA HEPATITE CRÔNICA PELO VÍRUS B NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO

XXXI Encontro de Extensão

Simão Barbosa Silva, Andreia de Cássia Brasileiro Rios Gomes, Rodrigo Vieira Costa Lima, Carlos Eduardo Lima, Valeska Queiroz de Castro, José Milton de Castro Lima

INTRODUÇÃO: A infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) é um problema global de saúde pública. Estima-se que existam 248 milhões de indivíduos com hepatite B crônica no mundo. A infecção crônica pode evoluir para cirrose e carcinoma hepatocelular, eventos de elevada morbimortalidade. **Objetivos:** Avaliar os esquemas terapêuticos utilizados no tratamento da infecção crônica pelo HBV nos serviços de Hepatologia (H) e Transplante hepático (TxH): Lamivudina (LMV), Adefovir (ADV), Entecavir (ETV), Tenofovir (TNF). **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal, descritivo, realizado através de revisão de prontuários e de bancos de dados de pacientes portadores de HBV em tratamento antiviral no período de maio/1999 a maio/2021, acompanhados nos serviços de (H), e (TxH). **Resultados:** total de 211 pacientes receberam drogas antivirais contra HBV, com média de idade de 51,6 anos [19 a 83 anos], 155 (73,5%) eram masculino. No serviço H, (n=92), foi utilizado o ETV em 45 (48,9%), TNF em 37 (40,2%), LMV em 8 (8,7%), associação 2 (2,2%); no serviço de TxH (n=109), utilizou o ETV em 52 (47,7%), TNF: 27 (24,8%), LMV: 18(16,5%), associação 12 (11%). Não houve diferença no uso do ETV entre os dois grupos, $p=0,99$; o uso do TNF foi mais frequente no grupo H, $p=0,016$; enquanto a associação de drogas foi mais frequente no grupo TxH, $p=0,015$. A cura da infecção (perda HBsAg, surgimento do anti-HBs, HBVDNA indetectável 3 anos consecutivos) ocorreu em cinco casos. Dois pacientes evoluíram ao óbito. O IFN convencional ou peguilhado foi utilizado em apenas 14 pacientes. O ADV foi utilizado em 25 pacientes, sendo 10 como droga isolada e em 15 associada a LMV. **CONCLUSÕES:** Predomínio do sexo masculino, a maioria fizeram uso de ETV no tratamento da hepatite crônica pelo HBV. Poucos pacientes fizeram uso de IFNc ou PegIFN. Apenas cinco pacientes obtiveram a cura. Mesmo com a utilização de drogas mais eficazes e com maior barreira genética (TNF, ETV), a LMV ainda estar sendo utilizada em 29 casos

Palavras-chave: Hepatite B. TRATAMENTO. CURA.