

RELAÇÃO ENTRE O NÍVEL DE INCAPACIDADE E A INTENSIDADE DA DOR DE MULHERES COM DOR PÉLVICA CRÔNICA

XV Encontro de Pesquisa e Pós-Graduação

Gleiciane Aguiar Brito, Natany Santos Martins, Hayres Holanda Costa, Ilana D'Ávila Fonteles de Sousa, Mayle Andrade Moreira, Simony Lira do Nascimento

Introdução: A Dor Pélvica Crônica – DPC é uma dor persistente percebida em estruturas relacionadas à pelve. A dor pode ser cíclica ou não e contínua ou recorrente por pelo menos 6 meses. Está frequentemente associada a consequências cognitivas, comportamentais, sexuais e emocionais negativas, trazendo diferentes nível de incapacidade para essas mulheres. **Objetivo:** Avaliar a relação entre o nível de incapacidade com a intensidade de dor de mulheres com DPC. **Método:** Estudo transversal, realizado com mulheres com DPC, no período entre setembro de 2019 a março de 2022 no ambulatório de DPC de uma maternidade de referência de Fortaleza-CE. Para avaliar ao nível de incapacidade aplicamos o questionário World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0) e para avaliar a intensidade de dor no dia da avaliação e nos últimos 30 dias aplicamos a Escala Visual Analógica de Dor. Utilizamos o teste ANOVA para comparação entre as médias. **Resultados:** Encontramos diferença estatisticamente significativa na pontuação do domínio autocuidado do WHODAS 2.0 e a intensidade da dor no dia da avaliação ($P=0,006$). E também valores significativos para os outros domínios e o score total quando comparados à média da dor nos últimos 30 dias. **Conclusão:** O nível de incapacidade está relacionado com a intensidade de dor de mulheres com DPC, sobretudo quando levamos em consideração a média dos últimos 30 dias.

Palavras-chave: MULHERES. DOR CRÔNICA. WHODAS 2.0. CIF.